

CARNET DE SUIVI DU PATIENT DE VOTRE MIDLINE



Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

N° de téléphone :

Numéro de lot :

Date de pose : / /

Veine ponctionnée : droite gauche

Longueur du cathéter inséré : Cm

Longueur du cathéter extériorisé : cm Repère à la peau :cm

Fixation: Securacath® colle statlock® grip-lock®

Picc line compatible avec une injection en pression ? oui non
(débit max : ml/s)

Ce carnet vous a été remis par :

VOTRE CATHETER EST PRECIEUX pour le suivi de votre traitement.

Ce carnet doit vous suivre pendant toute la durée d'utilisation de votre cathéter Midline.

Il peut être rempli par l'infirmier(e) qui vous prend en charge à l'hôpital ou à votre domicile. Il est demandé de l'emmener avec vous si vous devez être à nouveau hospitalisé(e) ou subir un examen d'imagerie.

Votre collaboration est essentielle pour le bon fonctionnement de votre cathéter Picc Line.

Ce document a pour objectif de vous apporter des informations concernant votre cathéter :



Recommandations au quotidien :

- Dépister toute inflammation au point d'insertion du Midline dans la peau : zone rouge, et/ou chaude et/ou douloureuse
- Signaler toute fièvre inexpiquée
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite de liquide (sang ou autre) au point d'insertion
- Signaler tout reflux de sang dans le cathéter
- Signaler tout gonflement de la main et/ou du bras du côté du Midline
- Signaler un pansement décollé ou souillé par un écoulement autour du cathéter : le pansement doit être étanche

Si vous arrachez votre Midline, comprimez le **point de ponction** et mettez un pansement.

DANS TOUTES CES SITUATIONS, CONTACTEZ VOTRE INFIRMIER(ERE) LIBERAL(E), MEDECIN OU LE SERVICE D'HOSPITALISATION A DOMICILE (SECRETARIAT H.A.D. 02 98 52 65 22).

Questions de patients :

1) Qu'est ce qu'un Midline

Le Midline est un cathéter (tuyau souple et fin) central (descendant à l'intérieur du thorax) inséré dans une veine de votre bras. L'extrémité de ce cathéter est située à la racine de votre bras.

Il a été posé sous anesthésie locale à l'aide d'un échographe par du personnel médical ou paramédical spécialement formé et entraîné pour la pose de ce type de cathéter.

2) A quoi sert mon midline ?

Il permet avec un meilleur confort :

- L'administration de médicaments intraveineux
- Les prélèvements sanguins itératifs et les transfusions sanguines
- L'hydratation

3) Pendant combien de temps puis je garder mon cathéter ?

Le midline est prévu pour une utilisation inférieure à 30 jours.

Il peut être retiré avant cette date, sur prescription médicale, à la fin de votre traitement ou si une complication devait survenir.



4) Comment dois-je me laver ?

L'hygiène quotidienne est essentielle.

Vous pouvez prendre des douches ou faire une toilette au lavabo. Mais veillez à protéger le pansement en recouvrant votre bras d'un film plastique alimentaire ou d'un système de protection type "protège plâtre". Faites-vous aider si nécessaire.

D'autres systèmes de protection existent. Vous pouvez demander conseil à votre pharmacien(ne).

Les bains sont déconseillés.

Vérifiez que le **pansement est toujours sec** après votre toilette.

5) Que dois-je connaître pour mon quotidien?

Vous pouvez continuer à faire la majeure partie de vos activités quotidiennes (vous promener, faire à manger, faire les courses, du petit bricolage ...)

Il est conseillé de porter des vêtements amples pour ne pas abimer votre pansement ou comprimer votre cathéter.

Il est déconseillé :

- De porter des charges lourdes avec le bras porteur du cathéter
- de faire des mouvements violents répétés (fendre du bois...)
- De pratiquer des sports pouvant provoquer une pression ou un choc sur le cathéter (tennis, sport de combat, chasse...)
- **Les sports aquatiques sont interdits**

6) Que dois-je savoir sur mon pansement ?

Le pansement sera changé tous les 7 jours par un(e) infirmier(ère)

Il peut être changé plus souvent si le pansement est mouillé, décollé, sale ou s'il y a un écoulement anormal au niveau du cathéter.

7) Comment enlève-t-on mon cathéter ?

Le midline peut être enlevé par un(e) infirmier(ère) sur prescription médicale. C'est un acte indolore.

8) Que dois-je faire si je suis hospitalisé(e) ?

Vous devez emporter votre carnet de suivi et préciser à l'équipe soignante que vous êtes porteur(se) d'un midline.

A l'attention du Médecin ou de l'Infirmier(ère) :



Surveillance quotidienne de la zone d'insertion :

- Signaler au médecin référent toute inflammation, écoulement ou PUS au point d'insertion du cathéter (suspecter une infection)
 - Signaler au médecin référent toute fièvre inexpliquée
 - Demander un avis pour toute injection difficile, douloureuse ou en cas de fuite de produit autour du cathéter (suspicion d'occlusion ou malposition du cathéter)
 - Signaler au médecin tout lymphœdème sur le bras du côté du Picc line (suspicion de thrombose)
- Refaire sans délai un pansement souillé, décollé, ou non occlusif en raison d'un écoulement autour du cathéter

Désinfection des mains à l'aide d'une solution hydro alcoolique avant chaque manipulation du cathéter

Utiliser une compresse imbibée d'un **antiseptique alcoolique** avant chaque utilisation des robinets ou de la valve bidirectionnelle

Réfection du pansement stérilement tous les 7 jours (hors décollement et souillure) et changement de la valve bidirectionnelle du cathéter

Rinçage pulsé du cathéter :

- A réaliser avant et après chaque injection, perfusion et /ou prélèvement sanguin
- une fois par semaine si non utilisation du cathéter
- Utiliser 2 seringues de 10 ml de sérum physiologique
- rinçage pulsé +++** (3 fois 3 ml, ne pas injecter le dernier ml)

Changement de la Valve bidirectionnelle :

- Doit être changée tous les 7 jours (ou avant si souillée par du sang)
- Clamper le prolongateur du Midline avant changement de valve puis le déclamper
- Doit être protégée entre deux utilisations si traitement discontinu

POUR LE PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL, EN CAS DE BESOIN, VOUS POUVEZ JOINDRE L'UNITE D'ACCES VASCULAIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE AU **02 98 52 60 60** POSTES : **25242** OU **26329**. Mail : acces.vasculaire@ch-cornouaille.fr

